

APHIDIDAE LIGURIAE

AUCTORE

P. M. FERRARI

—

Jam aliquot abhinc annis in colligendis Aphidibus operam impenderam, sed aliis occupationibus avocatus, eorum curam et inquisitionem deserui. Cum porro hoc anno nonnullas species aliquid novi praeseferentes occurserent, alias me inventurus et enumeraturus in spem adductus, studium hoc sum prosequutus.

Etsi in meis brevibus per vicinia excursionibus (decedente vere et autumno peractis) species initio vegetationis obvias aut alias pabulo deficiente non reperi, centum tamen et ultra earum enumerare mihi licet, quarum nonnullae aut omnino novae aut nondum in Fauna italica recensitae.

Quoad ordinationem generum et specierum spectat, opera ut plurimum Clariss. Prof. PASSERINI secutus sum, libris KALTENBACHII et C. KOCHII adjutus. Attamen typicam aphididarum collectionem exoptanti, plurimarum specierum revisionem necessariam esse facile patet: characteres enim specifici ex colore et pruina deprompti et ab aphidologis hucusque adhibiti cum cito evanescant, descriptiones illae animalibus vivis jam aptissimae, ad eos servatos dignoscendos aut nimis incertae aut inutiles prorsus fiunt. Sic igitur aphidologia adhuc se habet, quod si servatum individuum (praecipue generis *Aphis*) pre manibus teneas et de nomine inquiras, collectori saepissime credere omnino debeas nec dubium movere licet.

Specierum dispositio anathomicas idest immutabilibus characteribus innixa, pro temporis brevitate et collectionis meae exiguitate non dum sum adgressus; veruntamen minime impossibilem puto, si haec memorentur:

Colores magis minusve laeti animalis vivi in pallidum aut ochraceum aut brunneum alcoholis ope abeunt: niger immutabilis; in descriptione insecti viventis adnotanda quoque est postuma coloris mutatio.

Partes artuum organorum et appendices plurimae forma et dimensione constantes, conferantur inter se potius quam cum longitudine totius corporis, cuius segmenta succedente contractione breviantur.

Hisce omnibus rite perpensis comparatisque, eodem modo quo *genera*, singulas quoque *species* Aphididarum pro typis asservatis distinguere fas erit.

ORDO HEMIPTERA L.

Sub - ordo HOMOPTERA LATR.

Fam. APHIDIDAE.

PASSERINI *Aphid. italicae*, in Archiv. per la Zool. II. 1863.

Tribus I. APHIDINAE PASSER.

Gen. SIPHONOPHORA.

KOCK Die Pflanzenläuse Aphiden (1857) pag. 150.

Synopsis specierum hucusque in Liguria lectarum.

| | |
|---|----|
| 1. Tuberculum frontale haud dentatum | 2 |
| — Tuberculum frontale dentatum (!). | |
| 2. Dorsum tuberculis destitutum (aut omnino exiguis) interdum pulverulentum | 3 |
| — Dorsum manifeste tuberculatum | 15 |
| 3. Alae maculis nebulosis ad apicem nervorum. | |
| 1. <i>S. Aceris</i> Koch. | |
| — Alae immaulatae | 4 |
| 1. Corpus haud pulverulentum | 5 |
| — Corpus pulverulentum | 13 |
| 5. Nectaria longiora quam remota aut aequa longa ac remota | 6 |
| — Nectaria breviora quam remota | 11 |
| 6. Nectaria evidenter longiora quam remota | 7 |
| — Nectaria aequa longa ac remota: cauda pallescens . . . | 9 |
| 7. Cauda et corpus nigrum nitidum. | |
| 2. <i>S. Artemisiae</i> Koch. | |
| — Cauda pallescens | 8 |
| 8. Cauda dimidia nectaria nigra longitudine aequat. | |
| 3. <i>S. Rosae</i> L. | |
| — Cauda quadrantem nectariorum pallescentium aequat. | |
| 4. <i>S. Urticae</i> Schlrk. | |

(!) *Siphonophora solani* KALT. hic locanda est.

9. Cauda dimidia neetaria aequat; neetaria aliquantulum longiora quam remota: antennae glabrae, corpus viride (pallescens).

5. *S. Ulmariae* Schrk.

- Cauda neetariis dimidiis brevior 10
10. Neetaria nonuihil longiora quam remota, basi apieque pallida: antennae pilosulae.

6. *S. Tussilaginis* Koch.

- Neetaria nigra; aequa longa ac remota.

7. *S. dubia* n. s.

11. Cauda nigra neetariorum nigrorum longitudinem sere aequat; neetaria medio crassiuscula.

8. *S. Viciae* Kalt.

- Cauda neetariis manifeste brevior 12
12. Cauda pallescens, bis trientem neetariorum aequat; corpus viride (pallescens) aut brunneum.

9. *S. cerealis* Kalt.

- Cauda brunnea dimidiorum neetariorum longitudine; corpus nigrum nitidum (annulis viridibus in vivo).

10. *S. Hieracii* Kalt.

13. Nigra, albo pulverulenta: macula dorsalis magna, puncti marginales nigri.

11. *S. Absinthii* L.

- Viridis (pallescens) aut olivacea absque macula dorsali vel punctis nigris marginalibus 14
14. Femina aptera antennarum articulo tertio erenu-
lato; viridis (pallescens) fascis transversis albo-pulve-
rulentis.

12. *S. Artemisiae* Boy. de F.

- Femina aptera antennarum articulo tertio erenu-
lato; olivacea, collo oehraceo, fascia media longitudinali la-
teribusque saturioribus.

13. *S. Millefolii* Fab.

15. Nectaria longiora quam remota 16
— Nectaria aequa longa ac remota aut breviora 19
16. Nectaria et corpus viridia, cauda concolor trientem vel dimidium neetariorum aequat; tubercula dorsalia in quovis segmento serie transversa.

14. *S. Inulae* n. s.

- Nectaria et corpus partim aut omnino nigra 17
 17. Cauda nigra dimidium nectariorum superat, nec eis
 multo crassior; tubercula dorsalia aequalia, medioeria.
 15. S. Solidaginis Fab.
 — Cauda pallescens 18
 18. Cauda dimidia nectaria aequalit; dorsum tuberculis me-
 dianis majoribus magisque adproximatis.
 16. S. Serratulae Kalt.
 — Cauda bis trientem nectariorum aequalit; dorsum tuber-
 culis aequalibus: collum et segmenta analia in alcoholle
 pallescentia.
 17. S. Picridis Fab.
 19. Nectaria nigra aequa longa ac remota; cauda nigra
 nectariis crassior eisque dimidiis longior, corpus ni-
 grum nitidum.
 18. S. Jaceae L.
 — Nectaria nigra, breviora quam remota 20
 20. Undique nigra nitida; cauda et nectaria aequa longa:
 antennae corpore longiores (etiam in vivo).
 19. S. atra n. s.
 — Supra brunneo-violacea nitens (aliquando opaca) inferne
 dilutior, opaca; nectaria sursum evidenter attenuata,
 antennae longitudine corporis.
 20. S. Campanulae Kalt.

REVISIO SPECIERUM.

1. Siphonophora Aceris Koch (*Drepanosyphum*) Die
Pflanzenläuse Aphiden 1837, pag. 202, fig. 276.

Forma nota: femina alata.

In ramulis *Aceris campestris*. Novi Ligure prope la Bella-
mejo. Junio 1862.

2. S. Artemisiae Koch l. c. pag. 163 fig. 226, 225.

Formae notae: fem. vivipara aptera et alata. Long. mill. 1. 2/3.

Nigra, supra nitida, inferne opaca. Abdomen marginatum, pilis tenuissimis pallidis serie transversa in quovis segmento, in tuberculo admodum exiguo et inconspicuo insidentibus. Nectaria longitudine fere tibiarum posticarum. Cauda nigra sursum curva, nectariis $\frac{1}{4}$ vel $\frac{2}{3}$ brevior. Rostrum acetabula pedum posticorum adtingit. Antennae longitudine corporis.

Legi in *Artemisia campestris* et *Leucanthemo vulgari*. Feminae apterae autumno, alatae occurunt rariores, vere. Stazzano 1862-1871.

In synopsi operis PASSERINI: *Aphididae italicae inserenda* pag. 11.

- PP** Pedes nigri, femoribus basi luteis adde:
 * Antennae corpore longiores, cauda dimidium nectariorum aequans.
S. Jaceae Linn.
 ** Antennae longitudine corporis, cauda vix nectariorum trientem aequans.
S. Artemisiae Koch.

3. **S. Rosae** LINN. (*Aphis*) Syst. nat. Vol. II. pag. 374,
n. 9. — KALTEMBACH Monograph. der Pflanzenläuse pag. 3.
n. 1.

Siphonophora Rosae Koch l. c. pag. 178. fig. 245, 246. —
PASSERINI Aphididae italicae pag. 40 et 41. n. 8.

In *Rosis* cultis et sponte crescentibus, nec non in *Centranthus rubro*, et *Scabiosa officinali*. Genuae, Stazzano, vere et aestate.

4. **S. Urticae** SCHRANK (*Aphis*) Fauna Boica Vol. II.
pag. 106. n. 1186 -- KALT. l. c. pag. 13. n. 4.

Siphonophora Urticae Koch l. c. pag. 454. fig. 208, 209. —
PASSER. l. c. pag. 40, 44. n. 9. Stazzano in *Urtica dioica*.
Junio 1874.

5. **S. Ulmariae** Schrank (*Aphis*) F. Boie. Vol. II.
pag. 411. n. 1221. — PASSER. (*Siphonophora*) l. c. pag. 10
et 13. n. 8.

A. *Onobrychis* BOYER DE FONSCOLOMBE in Annal. de la Soc. Entomol. de France. T. X 1841. pag. 169.

A. *Pisi* KALT. l. c. pag. 23. n. 11. — Koch (Siphonophora) l. c. pag. 490. fig. 261, 262.

S. *Gei* Koch ibid. fig. 234, 235.

Genuae in *Geo urbano*, *Rosis* cultis et *Hyosieride radiata*, vere.

6. **S. Tussilaginis** Koch l. c. pag. 438. fig. 213, 214.
— PASSER. l. c. pag. 41 et 16. n. 16.

Antennarum articulus tertius haud manifeste crenulatus; in femina alata a basi ad apicem gradatim, in aptera a dimidio ad apicem attenuatus.

Genuae in *Tussilagine Farfara*.

7. **S. dubia** n. s.

Femina aptera long. 2 mill.

Antennae corpore breviores, in vivo ad septimum segmentum dorsale vix extensae.

Corpus viride (in alchole pallescens) capite thorace et lateribus abdominis infuscatis.

Dorsum nigrescens, pilis transversis seriatis, in tuberculo minimo et inconspicuo insidentibus; lateribus marginatis.

Cauda pallido-virens, vix $\frac{1}{3}$ nectariorum aequans, basi crassior, apice acuto.

Nectaria nigra aequa longa ac remota, quadrantem femorum anticorum metientia.

Pedes nigri, basis femorum viridis.

Rostrum acetabula pedum mediorum in vivo non adtingit. Stazzano, in *Artemisia campestris* una cum *S. Picridis*, autunno 1864.

In synopsi op. citat. D. PASSERINI inserenda pag. 41.

R Dorsum haud manifeste tuberculatum. adde :

* Antennae corpore longiores, dorsum absque pilis transverse seriatis: nectariis in medio pallidis quadrantem

femorum antecorum aequantia: canda basi non dilatata,
pallide flava.

S. Tussilaginis Koek.

- ** Antennae corpore paulo breviores, dorsum pilis transversim seriatis, nectariis omnino nigris, vix $\frac{3}{4}$ femorum antecorum; canda conica, virescens.

S. dubia n. sp.

8. **S. Viciae** KALT. (*Aphis*) l. c. pag. 20. n. 9. — Koch (*Siphonophora*) l. c. pag. 188. fig. 259, 260. — PASSER. Flora degli Afidi italiani, in Bullett. della Soc. entomol. ital. 1871. pag. 251.

Novi Ligure 1862. In *Lathyrus latifolius*. Junio, Septembri: haud rara.

9. **S. cerealis** KALT. (*Aphis*) l. c. pag. 16. n. 6. — Koch (*Siphonoph.*) l. c. pag. 186. fig. 255, 256. — PASSER. *Aphid. ital.* pag. 10 et 11. n. 3.

Genuae in *Hordeum murinum*, *Holcus mollis*. Aestate.

10. **S. Hieracii** KALT. (*Aphis*) l. c. pag. 17. n. 7. — Koch (*Siphonoph.*) l. c. pag. 152. fig. 206, 207.

Genuae in *Urospermum Dalechampii*. Aprili 1867,

11. **S. Absinthii** L. (*Aphis*) Syst. nat. Vol. II. pag. 733, 19. — SCHIRK. F. B. II. 123. — KALT. l. c. pag. 31. n. 19. — Koch (*Siphonoph.*) l. c. pag. 198. fig. 271, 272. — PASSER. l. c. pag. 10 et 15. n. 12.

Genuae et Stazzano in *Artemisia Absinthio* et *A. Campestris*. Autumno.

12. **S. Artemisiae** BOYER DE FONSCOL. (*Aphis*) l. c. T. X. 1841; pag. 162. — PASSER. (*Siphonoph.*) l. c. pag. 10 et 12. n. 5. *Aphis tanacetaria* KALT. l. c. pag. 19. n. 8. Koch (*Siphon.*) l. c. pag. 187. fig. 257, 258.

Stazzano in *Althaea officinali*. Junio 1871.

13. S. millefolii FABR. (*Aphis*) Entomol. Syst. Vol. IV. pag. 214. n. 47. — SCHRANK l. c. Vol. II. n. 1243. — KALT. l. c. pag. 40. n. 2. — KOCH (*Siphonoph.*) l. c. pag. 182; fig. 249, 250. — PASSER. l. c. pag. 40 et 42. n. 4.

Stazzano: in summitatibus et circa flores *Achilleae millefolii*. Junio.

14. S. Inulae n. sp.

Femina aptera Long. fere mill. 3.

Viridis, nitida.

Antennae corpore longiores, articulo tertio a basi ultra medium crassiori, externe scabro.

Dorsum tuberculis piliferis serie transversa in quovis segmento.

Nectaria lengiora quam remota, longitudine femorum antecorum; viridia.

Cuuda viridis vix trientem nectariorum aequat.

Rostrum pedes posticos fere adtingit.

Femina vivipara alata:

Antennarum articulus tertius crenulatus: quartus et quintus longitudine parum decrescentes; sextus trientem praecedentis aequat; septimus omnibus longior.

Stigma et costa alarum anticarum viridia; venae hyalinæ.

Tarsi brunnei.

Genuae: *Inulae viscosae* in summitatibus una cum capsino (*Macrolophus uubilus* H. SCHEFFER) satis communis vere et aestate.

In synopsi PASSERINI inserenda l. c. pag. 40.

G Forma aptera tuberculis dorsalibus setigeris.

* Tuberculi setigeri in duas series longitudinales.
(*S. Avellanae* Koch.)

** Tuberculi setigeri serie transversa in quovis segmento:
Antennae corpore longiores, rostrum ad pedes posticos extensum, nectaria longitudine femorum antieorum.

S. Inulae. n. sp.

15. **S. Solidaginis** FABR. (*Aphis*) Syst. Rh. pag. 295. 5.
— KALT. l. c. pag. 32. n. 20. — KOCH (*Siphonophora*) l. c.
pag. 197. fig. 269, 270. — PASSER. l. c. pag. 11 et 15. n. 14.
Stazzano, in *Centaurea cyano*. Septembri.

16. **S. Serratulae** KALT. (*Aphis*) l. c. pag. 25. n. 13. —
Koch (*Siphonophora*) fig. 215, 216, 217, 218, 219; 234?
Siphonophora Sonchi. PASSER. l. c. pag. 11 et 16. n. 18.
Genuae in *Hyosieride radiata* et *Soncho oleraceo*. Majo 1871.

17. **S. Pieridis** FABR. (*Aphis*) Ent. Syst. IV. 216. —
SCHRNK. l. c. Vol. II. pag. 121. n. 1235. — PASSER. l. c. pag. 11
et 16. n. 17.

Genuae in *Pieride hieracioide* et *Cichoria Intybus*. Julio.

18. **S. Jaceae** LINN. (*Aphis*) Faun. Succ. 991. — KALT.
l. c. pag. 26. — n. 15. — KOCH (*Siphonophora*) l. c. pag. 162.
fig. 220, 221. — PASSER. l. c. pag. 11 et 15. n. 15.

Longe differt a *S. Artemisiae* Koch fig. 226, 227. a PASSE-
RINI dubitativitatem citata.

Genuae (Valletta di Granarolo) in *Ruta graveolenti*
Majo 1863; Stazzano in *Centaurea nigra*, Junio 1871.

19. **S. atra** n. sp.

Formae notae: Femina vivipara aptera et alata. Long. 2 mill.

Nigra, nitida. *Antennae corpore longiores*, articulo tertio
ima basi brunneo.

Abdominis dorsum tuberculis piliferis transversim seriatis,
incisuris conspicuis, marginatum.

Venter nigrum, nitidum.

Nectaria bis trientem femorum anticorum metientia; bre-
viora quam remota.

Cauda nigra, *nectariorum longitudine*: parum recurva, nec-
taris nonnihil crassior.

Pedes nigri; in juvenibus atrovirides.

Stigma feminae alatae dilute brunneum.

Genuae, Julio, in *Artemisia camphorata* culta legit amiciss. M. D. Franc. Baglietto rei botanicae cultor; in eadem planta sponte crescente in locis aridis circa Stazzano occurrit mihi Septembri 1871.

In Synopsi op. cit. PASSERINI inserenda pag. 40.

NN-0 Cauda nectaria aequans.

* Antennae longitudine corporis, femora et tibiae basi pallidae, corpus rubro-violaceum; venter pallidius et opacum, nectaria subulata.

S. Campanulae Kalt.

** Antennae corpore longiores, articulo tertio ima basi brunneo; coetera omnino nigra nitida; nectaria haud manifeste subulata.

S. atra. n. sp.

20. **S. Campanulae** KALT. (*Aphis*) l. c. pag. 26. n. 14. Koch (*Siphonophora*) l. c. pag. 164, fig. 224, 225. — PASSER. l. c. pag. 10 et 15. n. 13.

Stazzano in *Crysocoma Linosyride*. Autunno.

Gen. PHORODON

PASSERINI: *Prospetto dei generi della famiglia degli afidi* 1860. — *Aphididae italicae*, pag. 17.

Synopsis specierum in Liguria lectarum.

| | |
|---|---|
| 1. Femina aptera tuberculo frontali valide dentato . . . | 2 |
| — » » » hand dentato . . . | 4 |
| 2. Corpus pilis capitatis instructus. | |
| 1. <i>Ph. Cannabis</i> Pass. | |
| — Corpus absque pilis capitatis. | |
| 3. Dens tuberculi frontalis, dentem articuli primi anten- | |
| narum superat aut aequat. | |
| 2. <i>Ph. Humuli</i> Schrnk. | |
| — Dens tuberculi frontalis, dente articuli primi anten- | |
| narum brevior. | |
| 3. <i>Ph. Pruni</i> n. sp.? | |

4. *Nectaria cylindrica*, tortuosa.

4. *Ph. Inulae* Pass.

— *Nectaria clavata*.

5. *Ph. Galeopsidis* Kalt.

REVISIO SPECIERUM.

21. **Phorodon Cannabis** PASSER. l. c. pag. 17. n. 1.
Stazzano in summitatibus *Cannabis sativa*. Autunno.

22. **Ph. Humuli** SCHRNK (*Aphis*) l. c. II. n. 1199. —
KALT. l. c. pag. 36. n. 24. — PASSER. (*Phorodon*) l. c. pag. 17
et 18. n. 2.

Stazzano in foliis *Humuli Lupuli*. Junio.

23. **Ph. Pruni** n. sp?

Aphis humuli KOCH l. c. pag. 115. fig. 154. partim.
Forma nota: Femina aptera.

Tuberculum frontale breviter dentatum: corpus flavovirens
fascis lateralibus transversis lineaque mediana longitudinali
intensoribus: absque pilis capitatis; dens tuberculi frontalis
dente articuli primi antennarum brevior.

Genuae. In pagina inferiori foliorum *Pruni Mahaleb*. Junio.

24. **Ph. Inulae** PASSER. l. c. pag. 17 et 18 n. 3.
Genuae in *Inula viscosa*, vere.

25. **Ph. Galeopsidis** KALT. (*Aphis*) l. c. pag. 35. n. 23.
— PASSER. (*Phorodon*) l. c. pag. 17 et 19. n. 3.

Prope Voltri: sub foliis *Polygoni hydropiperis*. Julio.

Gen. RHOPALOSIPHUM

KOCH *Die Pflanzen. Aphid.* pag. 23. — PASSER *Aphid. ital.* pag. 19.

26. **R. Latucae** KALT. (*Aphis*) l. c. pag. 37. n. 25. —
PASSER. (*Rhopalosiph.*) l. c. pag. 19 et 20. n. 1.
Prope Voltri, in *Soncho oleraceo*. Julio.

27. **R. Ligustri** KALT. (*Aphis*) l. c. pag. 48. n. 34. — Koch (*Ropalosiph.*) l. c. pag. 46. fig. 59, 60. — PASSER. l. c. pag. 20 et 21. n. 4.

Prope Genuam (Valletta di Granarolo) in *Ligstro vulgaris*. Vere.

Gen. MYZUS

PASS. *Prospetto dei generi della fam. degli Afidi — Aphid. ital.*
pag. 8 et 21. *charact. emend.*

Tuberculum frontale mediocre apice truncatum et saepius marginatum, nec conico-truncatum ut in G. Siphonophora.

28. **Myzus Cerasi** FABR. (*Aphis*) Entom. Syst. pag. 211. n. 6. — KALT. l. c. pag. 43. n. 34. — KOCH fig. 115, 116. — PASSER. (*Myzus*) l. c. pag. 21 et 22. n. 1.

Genuae in foliis crispatis *Pruni Mahaleb*, *P. Cerasi*, aestate et Stazzano autumno.

29. **M. Persiae** PASSER. Gli Afidi pag. 35. — *Aphid. ital.* pag. 22 et 23. n. 3.

Genuae in apicibus *Persicae vulgaris*. Majo.

30. **M. Lychnidis** KOCH (*Aphis*) l. c. pag. 66. excl. synon. fig. 86, 87. — PASSER. (*Myzus*) l. c. pag. 22 et 23. n. 4. Genuae in *Silene inflata*, Martio, et Stazzano in *S. italica*.

31. **M. Tanaceti** L. et auct. (*Aphis*) — KALT. l. c. pag. 47. n. 33. — KOCH (*Siphonophora*) l. c. pag. 156. fig. 211, 212. — PASSER. (*Myzus*) l. c. pag. 22 et 24. n. 6.

Stazzano, in summitatibus *Tanaceti vulgaris*. Autumno.

32. **M. tetrarhoda** WALCHER (*Aphis*) Annals and Magaz. of natural. hist. ser. II. 1849. T. IV. pag. 42. — PASSER. (*Myzus*) l. c. pag. 22 et 23. n. 8.

Siphonophora rosarum KOCH. l. c. pag. 180. fig. 247, 248.

Genuae in *Rosis cultis*, *Hieracio pilosella*, nec non Stazzano turmis innumeris feminarum apterarum et alatarum in surculis et foliis teneris *Coryli Avellanae*. Junio 1871.

33. **M. Ribis** L. et auct. (*Aphis*). — KALT. l. c. pag. 39, n. 26. — PASSER. (*Myzus*) l. c. pag. 22 et 25. n. 9.

Genuae in foliis et circa flores ejusdam *Pelargonii* et *Aloysiae citriodoriae*. Junio. Stazzano reperi individuum apterum, humi, ad caudicem *Salicis albae*. Octobri.

34. **M. Asclepiadis** PASSER. *Aphid. ital.* pag. 22 et 25. n. 10.

Genuae in Horto botanico familiis innumeris in *Asclepiade grandiflora*, *Citro aurantio*, *Nerio oleandro* 1862; in *Asclepiade tuberosa* 15 Novembbris 1871.

Gen TOXOPTERA

Koch l. c. pag. 233.

35. **Toxoptera Aurantii** BOY. DE FONSC. (*Aphis*) l. c. T. X. 1841. pag. 178. — Koch (*Toxopt.*) l. c. pag. 234. fig. 339, 380. — PASSER. l. c. pag. 28. n. 1.

A. Camelliae KALT. l. c. pag. 122. n. 94.

Genuae in foliis apicalibus et circa flores. *Citri aurantii*, *C. limonum* et sepissime *Camelliae japonicae* et *C. oleiferae*. Vere ad autumnum.

Gen. APHIS

Auct. PASSERINI l. c. pag. 29. *charact. emend.*

Antennae *tuberculo frontali minimo* persaepe suffulatae, ut plurimum glabrae, aliquando parce pilosae.

36. **Aphis Crataegi** KALT. l. c. pag. 66. n. 47. — PASSER. l. c. pag. 29 et 34. n. 2.

A. Pyri Koch l. c. pag. 108. fig. 145, 146.

Serravalle di Scrivia in foliis *Crataegi oxyacanthae*. Autunno.

37. **A. Holei** n. sp.

Forma nota. Femina vivipara aptera. Long. $1 \frac{1}{4}$ millim. Corpus pyriforme antice angustatum, pone medium valde

dilatum, modice convexum postice subtruncatum, late applanato-marginatum foveolisque praemarginalibus impressum: viride opacum, venis longitudinalibus subirregularibus saturatioribus, vix pruinatum: segmento dorsali quinto rubiginoso: penultimo tuberculis lateralibus destituto.

Antennae bis trientem corporis aequantes, flavo-pallidæ.

Nectaria femoribus anticis quadrante breviora, rubiginosa, apice fusca, convergentia.

Cauda virescens, medio sub-incrassata, vix dimidiorum nectariorum longitudine.

Pedes flavo-virentes; *tarsis*, apice femorum tibiænumque fuscis.

Prope Genuam (S. Fruttuoso) in *Holco mollii*. Majo.

In Synopsi op. cit. PASSERINI inserenda, pag. 29.

F Neetaria nigra aut rubiginosa.

* Neetaria nigra, apice attenuata, pallidiora: antennæ breves ($\frac{2}{3}$ corporis breviores): cauda perbrevis, brunnea.

A. Crataegi Kalt.

** Nectaria et quintum segmentum dorsale rubiginosum, antennæ longiusculæ ($\frac{2}{3}$ corporis aequantes), cauda viridis, dimidiorum nectariorum longitudine.

A. Holci n. sp.

38. A. **Brassicæ** Auct. KALT. l. c. pag. 106. n. 81. — Koch l. c. pag. 149. fig. 203, 204. — PASSER. l. c. pag. 25. n. 3.

A. Raphani SCHRNK. l. c. n. 1229.

A. Isatidis BOY. DE FONS. l. c.

Genuæ (S. Fruttuoso) in *Synapi arvensi*. Majo: in *Bras-sica oleracea* culta, Augusto.

Icones Kochi citatae quamquam ideam insecti optime praebant, minime sunt fideles: cauda enim fem. alatae (fig. 203) nigra, vittæ dorsales et puncta marginalia nimis aucta, in nostris exemplaribus non observantur.

39. A. **Malvae** KOCH l. c. pag. 125. fig. 169, 170. — PASSER. l. c. pag. 30 et 36. n. 7.

Genuae in Horto botanico R. Gen. Athenaei circa flores *Malvacearum*, Junio; sub foliis *Lavaterae arboreae* 15 Novembris 1871.

40. **A. Eupatorii** PASSER. *Aphid. ital.* pag. 30 et 36. n. 7 bis.

Voltri, circa flores *Stachidis rectae*, Julio. Stazzano in *Eupatoria cannabino*, Septembri.

41. **A. Saliceti** KALT. l. c. pag. 103. n. 78. — KOCH l. c. fig. 157, 158. — PASSER. l. c. pag. 30 et 37. n. 8.

In ramulis *Salicis viminalis*, Majo. Serravalle Scrivia.

42. **A. spectabilis** n. sp.

Femina aptera. Long. $1 \frac{1}{2}$ — $1 \frac{3}{4}$ millim.

Oblongo-elliptica, fusco viridis, medio et lateribus fusciori variegata, huc pulverulenta nec nitida.

Antennae dimidium corpus longitudine superant, articulo tertio vix duobus basilaribus conjunctis longiore: articulis 4, 5, 6, gradatim singulo praecedente brevioribus, septimo coeteris longiore.

Collum, abdominis *latera* et secundum segmentum anale utrinque mucronata.

Nectaria et *cauda* viridi-flava: illa bis triente hanc superant, et femora postica longitudine aequant.

Rostrum pedum posticorum acetabula adtingit.

Serravalle Scrivia: in surculis ejusdam *Salicis speciei*. Junio.

In Synopsi op. cit. PASSERINI inserenda pag. 30, et at seguitur modificanda.

N Nectaria longa flavescentia aut pallidissima.

* Cauda fuseo-viridis; latera et penultimate segmentum abdominis mutica.

A. Saliceti Kalt.

** Cauda et nectaria flavescentia; latera et abdominis penultimate segmentum utrinque mueronata; rostrum ad acetabula pedum posticorum extensum.

A. spectabilis n. sp.

43. **A. Urticæ** FABR. Entom. Syst. T. IV. pag. 217. — PASSER. l. c. pag. 30 et 37. n. 9.

A. Urticaria KALT. l. c. pag. 57. n. 39. — KOCH l. c. pag. 101. fig. 135, 136.

Novi Ligure in *Urtica dioica*. Genuae in *Rubo fruticoso* et *Clematide vitalba*. Vere et aestate.

44. **A. Chloris** KOCH l. c. pag. 91. fig. 122. — PASSER. l. c. pag. 31 et 39. n. 14.

Stazzano. In summitate haud florida *Hiperici perforati* et *Stachidis rectae*. Augusto.

45. **A. Helianthemi** n. sp.

Femina aptera et alata. Long. 1 mill.

Corpus ovato-elongatum laete-viride haud pulverulentum, medio et lateribus intensius variegatum.

Antennæ corpore breviores.

Collum et penultimum segmentum abdominis utrinque mucronata.

Nectaria atro-viridia, dimidium femorum anticum vix superant.

Cauda flava nectariis quadrante brevior, basi crassior.

Rostrum pedum posticorum acetabula adtingit.

Feminæ alatae caput et gibberes thoracis nigra.

Collum viride, macula atro-viride mucroneque utrinque praeditum.

Antennæ corpore breviores ($\frac{3}{4}$) articulis 3, 4, 5 pallidis apice fuscis, articulo tertio longitudine quintum et sextum simul aequante.

Pedes pallidi: tarsis femorum et tibiarum apicibus fuscis.

Stazzano, in *Heliantheemo vulgari*, Junio.

Diffr. ab A. *Chloride* pictura dorsi, longitudine articuli tertii antennarum et rostri.

In Synopsi operis citati D. PASSERINI inserenda pag. 31.

- S Cauda dimidium nectariorum excedens.
- † Cauda viridis, pedes flavescentes: rostrum pedes postieos non attingit.
A. Chloris Koch.
- ‡ Cauda flavescens, pedes pallidi: rostrum pedes postieos attingit.
A. Helianthemi n. sp.

46. **A. Plantaginis** SCHRNK. l. c. n. 4185. — KALT. l. c. pag. 59. n. 41. — KOCH l. c. pag. 402. fig. 137, 138? (male fucata). — PASSER. l. c. pag. 31 et 40. n. 17.

A. Dauci FABR. Entom. syst. IV. 217. n. 34. SCHRNK. l. c. n. 1200. In umbellis *Dauci carotae* et petiolis foliorum radicalium *Plantaginis majoris*. Stazzano. Autunno.

47. **A. convolvulicola** n. sp.

Forma cognita: Femina vivipara alata.

Long. vix mill. 2.

Oblongo elliptica, olivacea, haud pulverulenta.

Antennae nigrae corpore breviores ($\frac{2}{3}$), articulis 3, 4, 5, 6, 7, basi pallidis; articulus tertius externe subcrenatus, sequenti ($\frac{1}{3}$) longior; quintus vero sextum quadrante superat; extremus duos praecedentes aequat.

Dorsum pallescens punctis marginalibus quatuor utrinque et macula inter nectaria nigris.

Collum et penultimum segmentum abdominis utrinque mucronata.

Nectaria nigra, bis triente femorum anticorum, sive articulum quartum antennarum longitudine aequantia: a medio ad apicem attenuata, in macula brunnea insidentia.

Cauda nigra, dimidia nectaria aequans; eis duplo crassior, basi et apice attenuata.

Rostrum pedes medios adtingit.

Stazzano, in *Convolvulo arvensi* familia parum numerosa.
Junio.

In Synopsi op. cit. PASSERINI inserenda cum sequenti.

48. **A. Viticis** n. sp.

Long. mill. 1 $\frac{1}{4}$.

Femina aptera.

Ovato elongata, flavo-viridis, fascia mediana et duobus irregularibus longitudinalibus intensioribus, haud pulverulenta, pone nectariis abbreviata.

Antennae corpore breviores ($\frac{3}{4}$) pallidae, apice fuscae; articulus tertius extremo longior.

Collum et penultimum segmentum abdominis utrinque mucronata, minus vero marifeste quam in femina alata.

Dorsum subconvexum, incisuris inconspicuis; vittae irregulares virides postice oblitteratae; venter pallidius.

Nectaria brunnea bis trientem femorum anticorum aequantia: a basi ad apicem attenuata, *caudam* flavescentem et sursum recurvam plus duplo superantia.

Rostrum pedum mediorum acetabula superat, nec tamen postica adtingit.

Pedes pallidi, genubus tarsisque infuscatis.

Femina alata. — Corpus magis elongatum ac in aptera.

Caput, collum, thorax olivaceo fusca; *puttinuli* nigri.

Dorsum incisuris marginalibus conspicuis.

Antennae infuscatae; basis articulorum 3, 4, 5, pallida.

Femora postica a dimidio ad apicem, femora antica et media, tibiae tantum apice, et tarsi fusi.

Genuae in Horto botanico ad ramulos et folios *Viticis Agni casti*. Junio.

In Synopsi op. cit. PASSERINI inserendae pag. 31.

X Collum utrinque mucronatum.

♀ Rostrum pedes posticos adtingit. cauda nigra.

A. Plantaginis Schrnk.

†† Rostrum pedes posticos non adtingit.

* Cauda nigra.

A. convolvulicola n. sp.

** Cauda lutescens.

A. viticis n. sp.

49. **A. Malii** Auct. KALT. l. c. pag. 72. n. 52. — KOCH
l. c. pag. 107. fig. 143, 144. — PASSER. l. c. pag. 31 et 40. n. 19.
Genuae et Stazzano in *Pyro Malo*. Junio.

50. **A. Cardui** Auct. KALT. l. c. pag. 115. n. 89. — PASS.
l. c. pag. 31 et 41. n. 22.

A. Onopordi SCHRNK. l. c. n. 1236.

A. Chysanthemi KOCH pag. 73. fig. 95, 96.

Genuae in *Cynara Scolymo* et *Carduum* spec. Vere et aestate.
Stazzano in calycibus *Onosmae stellulatae*. Septembri-Novembris.

51. **A. Medicaginis** KOCH l. c. pag. 94. fig. 125, 126.
— PASSER. l. c. pag. 34 et 42. n. 23.

Genuae, in *Spartio junceo*. Majo.

52. **A. Apocyni** KOCH l. c. pag. 97. fig. 131, 132.
Stazzano, in foliis et circa flores *Ononidis natricis*.

In *Synopsi citati oper. Prof. PASSERINI cum sequenti specie addenda*, pag. 32.

c Cauda nigranectariis paulo brevior.

✗ Nectaria in medio crassiuscula: abdominis latera tuberculata.

A. Apocyni KOCH.

✗✗ Nectaria in medio haud incrassata; rostrum ad pedes posticos extensum.

✗ Nectaria cylindrica, basi subincrassata: antennae corpore longiores, species aerea.

(*A. sedi* Kalt.)

✗✗ Nectaria cylindrica basi haud crassiuscula: antennae dimidium corpus aequantes; species subterranea.

A. Coronillae n. sp.

33. A. **Coronillae** n. sp.

Forma cognita: femina vivipara aptera. Long. vix millimi. 4.

Ovato elliptica, postice obtuse acuta, nigro-virescens aut livido-nigra, cimereo pruinosa, segmentibus analibus dilutioribus.

Antennae glabrae dimidii corporis longitudine, nigrescentes, articuli 3 et 4 exalbidi, in articulatione haud bene distincti, cylindrici nec crenulati; articulus quintus sequenti $\frac{1}{4}$ longior, basi ambo attenuati; extremus filiformis subulatus, duos praecedentes longitudine aequans.

Dorsum incisuris thoracicis et analibus manifestis, dorsalibus inconspicuis. foveolisque transversis praemarginalibus praeditum.

Collum abdomen et anum mucronata.

Nectaria cylindrica, nigra, crassitie sua plus duplo longiora, tarsos posticos (uncis exceptis) longitudine aequantia, ultra quadrantem longa quam remota.

Cauda nigra, basi (supra) attenuata, nectariorum crassitiem aequans eisque paulo brevior.

Rostrum ad acetabula pedum posticorum extensum; articulus basilaris duobus sequentibus conjunctis longinseulus.

Pedes validi, pallescentes: femorum tibiarumque apex et tarsi nigrescentes.

Radicem *Coronillae pusillae* in qua familiis numerosis insidet, nisi vi coacta tardisque gradibus deserit.

Stazzano, 14 Septembris 1871.

34. A. **Rhamni** KALT. l. c. pag. 64. n. 45.

A. *Frangulae*. Koch l. c. pag. 142. ag. 192, 193. — PASSER. l. c. pag. 32 et 42. n. 25.

Stazzano in *Origano vulgari*. Octobri.

35. A. **Punicae** PASSER. *Aphidid. ital.* pag. 32 et 42. n. 26.

Femina aptera et alata.

Rostrum pedes medios longitudine superat.

Genuae Horto botanico R. Athenaei, in foliis et floribus *Punicae Granati* Junio et Julio.

56. **A. Consolidae** PASSER. l. c. pag. 32 et 43. n. 27.

Femina aptera. Stazzano, in *Matricaria Chamomilla*. Majo.

57. **A. Hederae** KALT. l. c. pag. 89. n. 65. — KOCH
l. c. pag. 91. fig. 121. — PASSER. l. c. pag. 32 et 43. n. 29.
Genuae in *Hedera Helice*. Aprili.

58. **A. brunnea** n. sp.

Femina vivipara aptera. Long. fere mill. $1 \frac{1}{2}$.

Ovato oblonga, postice sub-acuminata, rubro-fuscescens,
parce albo pruinosa, incisuris abdominis obsoletis, foveolis
praemarginalibus conspicuis.

Antennae dimidium corpus fere aequantes, pallidae; articulus quintus apice, sextus (basi excepta) et septimus, (hic duos praecedentes conjunctos vix aequans articuloque tertio brevior) nigri.

Collum, latera abdominis, annis mucronata.

Cauda nigra nectariis $\frac{2}{3}$ brevior.

Nectaria nigra, femoribus anticis fere longiora, tarsos posticos quadruplo superant; inter se remota $\frac{3}{4}$, propriae longitudinis.

Rostrum pedes posticos adtingit.

Pedes pallidi; tarsi, apex femorum posticorum et tibiarum genuaque nigra.

Nimphae thecis alarum viridulis externe nigris; maculis albo pruinosis in capite, collo, earumque quatuor transversis super abdominis incisuras praeditae.

Stazzano. Reperi in summiatibus *Ononis natricis*. Augusto.

In citata Synopsi collocanda pag. 32.

H Femora media et postica albida.

* Nectaria tarsos posticos quadruplo non superant longitudine: corpus brunneo-fuscum.

A. Hederae Kalt.

** Nectaria tarsos posticos quadruplo superant longitudine; corpus rubro fuscescens, nimphae dorso albo lineatae.

A. brunnea n. sp.

59. **A. Intybi** Koch l. c. pag. 148. fig. 201, 202. — PASSER. l. c. pag. 32 et 44. n. 30.
Genuae aestate in *Cichoria Intybo*.

60. **A. Sambuci** Auct. KALT. l. c. pag. 83. n. 60. — Koch l. c. pag. 83. fig. 111, 112. — PASSER. l. c. pag. 32 et 44. n. 31.

Genuae in *Sambuco nigra*, *Pittosporo Tobira*, *Agave*, *Hemerocallii albida* aliisque plantis Horti botanici et agri Ligustici. A vere ad autumnum.

61. **A. Silybi** PASSER. Additamenta ad indicem Aphid. in Atti della Soc. ital. di Scienze natur. Vol. III. pag. 400. Ejusd. Aphid. ital. pag. 32 et 44. n. 32.

Femina alata et aptera viviparae.

Prope Genuam (Quinto) in *Borragine officinali*. Julio.

62. **A. Laburni** KALT. l. c. pag. 85. n. 61. — Koch l. c. pag. 86. fig. 114. — PASSER. l. c. pag. 32 et 45. a. 33.

Stazzano, in surculis *Spartii juncei*, Augusto.

63. **A. Papaveris** FABR. Ent. Syst. IV. pag. 218. n. 38. — KALT. l. c. pag. 82. n. 59. — PASSER. l. c. pag. 32 et 45. n. 36. *A. Thlaspeos* SCHRK. l. c. n. 1223, 1227. — Ejusd. l. c. n. 1183. *A. Apurines*.

A. Fabae. Scopoli Entom. Carniol. n. 406.

Genuae in *Vicia faba*, *Solanum nigrum*, *Amaranthus albus*, *Digitalis purpurea* etc. A vere in autumnum.

64. **A. Romicis** L. Syst. nat. II. pag. 734. — KALT. l. c. pag. 81. n. 58. — Koch l. c. pag. 140. fig. 190, 191? — PASSER. l. c. pag. 33 et 46. n. 37.

Genuae in foliis *Romicis amplexicaulis* et *R. intermedii*. Vere.

65. **A. Craccae** SCHRK l. c. 119. — PASSER. l. c. pag. 33 et 46. n. 37 bis.

Stazzano in *Genista ovata*. Junio.

66. **A. Carotae** Koch l. c. pag. 112. fig. 449. — PASS.
l. c. pag. 33 et 48. n. 44.

Stazzano in *Dauco Carota et Pastinaca sativa*. Autumno.

67. **A. Silenea** n. sp.

Long. mill. 1 $\frac{1}{2}$.

Femina vivipara aptera.

Viridis, albo pulverulenta.

Antennae corpore breviores.

Nectaria viridifusca, crassitatem suam longitudine parum superant.

Cauda viridi fusca, nectariis duplo longior.

Pedes exalbidi, tarsis, apicibus femorum et tibiarum fuscis.

Rostrum ad acetabula pedum mediorum extensum.

Femina alata.

Antennae corpore breviores, articulo tertio externe crenulato, duorum sequentium conjunctorum longitudine.

Dorsum laete viride, medio et lateribus, rivulis saturati-ribus; plieis analibus obscurioribus.

Stazzano. In foliis apicalibus *Silenis inflatae*. Junio.

In Synopsi Passeriniana inserenda, pag. 33.

pp Canda et nectaria brevissima.

* Canda et nectaria circiter aequa longa ac lata corpus pallide viridulum.

A. Carotae Koch.

** Canda nectariis aequa longis ac latis longior; dorsum viride rivulis saturatioribus.

A. Silenea n. sp.

68. **A. Donacis** PASSER. Addit. in Atti. d. Soc. ital. di scienz. natur. Vol. III. pag. 399. — Ejusd. Aphid. ital. pag. 33 et 39. n. 46.

Genuae et Stazzano in vagina foliorum *Arundinis Donacis*. Vere ad autumnum.

69. **A. Persicae** BOY. DE FONSC. I. c. pag. 175. — KALT. I. c. pag. 93. n. 68. — KOCH I. c. pag. 61. fig. 78, 79. — PASSER. Aphid. ital. pag. 34 et 39. n. 47.

A. Insititiae KOCH. I. c. fig. 74. 75?

Genuae et Stazzano in foliis crispatis *Persicae vulgaris*.

Speciebus sequentibus accedentibus, Synopsis operis citati Prof. PASSERINI ut sequitur modiscanda, pag. 34.

α' Dorsum haud unicolor.

α Neetaria nigra.

β Dorsum feminae apterae viride, fascis saturationibus nigris interdum confluentibus, rostrum pedes posticos adtingit.

A. Persicae BOY d. Fons.

$\beta\beta$ Corpus fem. apterae viride: caput, fascia longitudinalis mediana aliisque transversis, carneis; series duplex utrinque punctorum nigrorum praemarginalium; rostrum ad segmentum nectariorum extensum.

A. Farfarae KOECH.

$\alpha\alpha$ Neetaria flava: abdomen flavoviride maculis duobus marginalibus utrinque et fascia transversa lata postica, nigris. Rostrum pedes medios adtingit.

A. Jani n. sp.

$\alpha'\alpha'$ Dorsum unicolor etc.

70. **A. Farfarae** KOECH I. c. pag. 54. fig. 68, 69.

Femina alata et aptera.

Stazzano in pagina infera folior. *Tussilaginis Farfarae*. Octobri.

71. **A. Jani** n. sp.

Femina alata. Long. mill. 2. $\frac{1}{4}$.

Antennae corpore longiores, nigrae: articulus tertius crenulatus, sequenti quadrante longior; sextus basilarem aequat; extremus longitudine quarti et quinti conjunctim.

Caput et thorax fusco nigri; *collum* utrinque mucronatum.

Dorsum viridiflavum postice dilatatum pone nectariis subabbreviatum; maculis duobus praemarginalibus nigris utrinque supra vittas transversas virides, medium non attingentes impositis; fascia transversa nigra integra quartum et quintum segmentum occupat; plicae anales atrovirides.

Nectaria viridiflava, cylindrica, dimidiis femoribus anticis quadantenuis breviora.

Cauda tuberculiformis, inconspicua.

Tarsi, femora (basi excepta) tibiarumque apex nigra.

Nimphae flavo virides vel dilute virides; vittae saturationes transversae super incisuras dorsi melium non adtingunt ibique spatium ellipticum relinquunt.

Antennae viridulae articulis apice fuscis, cauda tuberculiformis minus longa quam lata.

Prope Genuam. (Valletta di Granarolo).

Planta quae hanc alit speciem, cum animaleculis allata mihi non fuit.

72. **A. Myosotidis** Koch l. c. pag. 57. fig. 72, 73. — PASSER. l. c. pag. 34 et 49. n. 48.

Genuae in *Lepidio Draba*.

73. **A. Tragopogonis** Kalt. l. c. pag. 124. n. 96. — PASSER. l. c. p. 34 et 50. n. 51.

Stazzano in *Tragopogone pratensi* et *T. majore*. Aestate et Autumno.

Cauda brevissima adest, sursum recurva, nigra: plerumque in femina aptera incisurae et linea media dorsi pallidiores.

74. **A. Prunicola** KALT. l. c. pag. 122. n. 95. — PASS. l. c. pag. 34 et 50. n. 50.

A. Cerasi SCHRNK. l. c. n. 1218.

Stazzano in *Persica vulgaris*. Junio.

75. **A. Lappae** Koch l. c. pag. 50. fig. 63. — PASS. l. c. pag. 34, 50. n. 53.

Femina aptera.

Stazzano ad radices *Lappae minoris*. Augusto 1871.

Gen. SIPHOCORYNE

PASSERINI: *Prospetto dei generi della famiglia degli Afidi. Aphididae ital.* pag. 52. ejusd.

76. **S. Xylostei** SCHRNK. Faun. boic. 1493. — KALT. l. c. p. 111. n. 85. — Koch (*Rhopalosyphum*) l. c. pag. 33. fig. 42, 43. — PASSER. (*Siphocoryne*) l. c. pag. 52 et 53. n. 3.

Aphis Lonicerae BOY. DE FONSC. l. c. pag. 167.

Genuae in *Lonicera Xylosteo*. Majo.

Gen. MYZOCALLIS

PASSERINI *Aphididae ital.* pag. 8. et 53.

77. **M. Ononidis** KALT. (*Aphis*) Entomol. Zeitung. Vol. VII, 173. Koch l. c. (*Chaitophorus*) pag. 5. fig. 7. PASSER. l. c. (*Myzocallis*) pag. 53 et 54. n. 4.

Femina aptera et alata.

Genuae in *Ononide spinosa* vere et aestate. Stazzano in *Medicago sativa*. Autumno.

78. **M. Quercus** KALT. (*Aphis*) l. c. pag. 98. n. 74. — Koch (*Callipterus*) l. c. pag. 218. fig. 290. — PASSER. l. c. pag. 54. n. 2.

Stazzano, in foliis *Quercuum*. Autumno.

79. **M. Coryli** GOETZE (*Aphis*) Entomol. Beiträge II. pag. 311. — KALT. l. c. pag. 98. n. 73. — Koch l. c. (*Callipterus*) pag. 215. fig. 287. — PASSER. l. c. (*Myzocallis*) pag. 54 et 55. n. 4.

Callipterus Carpini Koch, pag. 216, fig. 288.

Genuae in pagina infera foliorum *Coryli Avellanae* Horti Botanici. Julio.

Gen. CLADOBIUS

Koch *partim*; PASSER. *Aphid. ital.* pag. 9 et 55.

80. **C. Populea** KALT. (*Aphis*) l. c. pag. 416. n. 90. — Koch (*Cladobius*) l. c. pag. 252. fig. 327, 328. maxima in parte. — PASSER. l. c. pag. 53 et 56. n. 2.

Genuae in ramulis *Populi italicae*, Majo.

Gen. CHAITOPHORUS

Koch *Die Pflanz. Aphid.* pag. 4.

81. **C. leucomelas** Koch l. c. pag. 4. fig. 5, 6. — PASSER. l. c. pag. 57. n. 1.

Stazzano. In gallis foliorum (praecipue petioli et nervorum) *Populi nigrae*. Augusto.

82. **C. salicivora** PASSER. Gli A fidi, pag. 37; *Aphidid. ital.* pag. 57 et 58. n. 3.

In *Avena satua*, Majo, et in pagina infera foliorum *Dactylis glomeratae* secus nervum medium. Genuae (fossato di Porta Pila). Julio.

83. **C. Vitellinae** SCHRNK. (*Aphis*) l. c. pag. 103. n. 1178. — KALT. l. c. pag. 97. n. 72. — PASSER. (*Chaitophorus*) *Aphid. ital.* pag. 57 et 59. n. 5.

Stazzano in ramulis teneris *Salicis albae* et *S. vitellinae*. Autumno.

84. **C. versicolor** Koch l. c. pag. 40. fig. 14, 15. — PASSER. l. c. pag. 57, 59. n. 6.

Aphis Populi var. KALT. l. c. pag. 128.

Genuae et Stazzano, sub foliis *Populi nigrae*. Aestate et autunno.

85. **C. Saliceti** Schrnk. *Aphis* l. c. n. 4477. — KALT. l. c. pag. 121. n. 93. — PASSER. (*Chaitophorus*) l. c. pag. 57 et 60. n. 8.

Genuae, sub foliis *Salicis albae*. Junio.

Gen. PTEROCALLIS

PASSERINI *Aphididae itaticae*, pag. 9 et 60.

Synopsis specierum in Liguria lectarium.

1. Alarum antiecarum venae obliquae in maculam fuscam trigonam dilatatae; abdomen punctis marginalibus nigris.
P. Tiliae L.

— Alarum antiecarum venae obliquae vix dilatatae in maculam nebulosam; abdominis margo absque punctis nigris

2. Dorsum immaculatum.
P. Alni Fabr.

— Dorsum serie mediana macularum.
P. pictus n. sp.

REVISIO SPECIERUM.

86. **P. Tiliae** Auct. (*Aphis*) — KALT. l. c. pag. 129. n. 99. — Koch l. c. (*Callipterus*) pag. 209. fig. 282, 283. — PASSER. l. c. (*Pterocallis*) pag. 61. n. 4.

Genuae, in pagina infera foliorum. *Tiliae europeae*. Aestate.

87. **P. Alni** FABR. (*Aphis*) Entom. Syst, IV. pag. 215, 26.
— KALT. l. c. pag. 137. n. 105. KOCH l. c. (*Callipterus*) pag. 211.
fig. 284. — PASSER. Gli Afidi et Aphidid. ital. pag. 61. n. 2.

Voltri, in pagina infera foliorum *Alni glutinosae*; aestate.
Stazzano autunno.

88. **P. pictus** n. sp.

Forma cognita: femina alata. Long. millim. 4 $\frac{1}{4}$.

Corpus elongatum pallide flavum; supra pictura et serie macularum prope lineam medianam brunnearum; abdominis margo non punctatus; alarum anticarum venae in maculam nebulosam apice vix dilatatae.

Antennae corpore breviores; articulus tertius gradatim a di-midio ad basim subincrassatus; articulus quintus duos se-quentes longitudine aequat; sextus apice incrassatus; septimus praecedente $\frac{1}{3}$ brevior. Articuli pallidi, 3, 4, 5, 6, apice, 7 omnino fuscus.

Maculae 2 triangulares in vertice, e tribus lineolis conjunctis ad instar trianguli efformatae.

Colli latera sinuata, lineola fusca marginali: supra lineis fuscis 4 adproximatis, quarum internae majores postice dilatatae; externae tenues obliquae et sinuatae.

Pronotum lineis tribus invicem decussatis.

Scutellum maculä trigona fusca.

Dorsum serie mediana macularum subellipticarum spatiolum flavidum subrotundum includentium, maculae 2 triangulares adproximatae in sexto segmento; stria inter maculas utrinque in 3-6 segmento, fuscae.

Nectaria bis crassitiem longitudine superant.

Oculi rubri.

Rostrum finem mesosterni adtingit.

Pedes pallidi, tarsis fuscis.

Genuae, vagans in ambulacro Acquasola. Majo 1871.

Tribus II. LACNINAE PASSER.

Gen. SYPHA

PASSER. *Aphidid. Ital.* pag. 62.

89. **S. Maydis** PASSER. l. o. pag. 63. n. 2.

Femina vivipara aptera.

Stazzano. Ad collum radicis *Avenae sativae*, in vagina fo-liorum et spatha *Zeae Maydis*. Septembri.

Dubito an alia sit species aut saltem varietas quam in radice *Avenae* et culmine *Cynodontis Dactylon* inveni; subitus enim non rubiginosum sed atro-viride est venter; margo trium segmentorum basilarium albescens; antennae fere dimidi corporis longitudine, articulo tertio paullo duos sequentes superante.

Juvenes flavo-viridulæ, uti adultæ setulosæ, capite subfusco, fascis dorsi duobus viridibus longitudinalibus postice secedentibus et circa locum nectariorum externe flexis.

Gen. LACHNUS

Passer. Aphidid. ital. pag. 62 et 64 emendend.

Antennæ glabrae aut pilosulae.

Synopsis specierum.

A Abdomen tuberculo conico inter nectaria praeditum:
L. viminalis Passer.

AA Non.

B Rostrum corpore brevius:

b Tarsi postici ceteris triplo longiores:

L. longitarsis n. sp.

bb Non.

β Femina aptera elliptico-oblonga, glabra:

L. pinicola Kalt.

ββ Femina aptera subglobosa, pubescent,

(*L. Juniperi* Deg.) (1).

BB Rostrum corpore duplo saltem longius:

C Femina vivipara aptera fusco-nitida, antennarum articulo quinto praeecedente aequali et sequente breviore:

(*L. Quercus* Kalt.)

CC Femina vivipara aptera cinereo-pulverulenta, antennarum articulo quinto praeecedente et sequente longiore:

L. longirostris Pass.

(1) Species () iclusae, nondum lectae in Liguria.

REVISIO SPECIERUM

hucusque in Liguria lectarum.

90. **L. viminalis** BOY. DE FONSC. (*Aphis*) l. c. pag. 184.
 — PASSER. (*Lachnus*) Aphid. ital. pag. 64. n. 1.
 Stazzano, ad corticem rimosam *Populi nigrae*.

91. **L. longitarsis** n. s.

Femina alata vivipara. Long. 4 millim.

Corpus modice elongatum (ad instar L. Juniperi KOCH, Aphid. fig. 319) et gradatim usque ad nectaria dilatatum, postice subrotundatum et parum productum; pilis brevibus exalbidis undique instructum.

Antennae ad apicem scutelli extensa, nigrae, parce pilosae articulis duobus basilaribus parvis, tertio omnium longiore; quarto sequente breviore; extreto appendiculato, praecedente nonnihil longiore.

Thorax et pectus nigra, parum nitida.

Abdomen olivaceum, maculis quinque marginalibus subquadatis super incisuras, et aliis medianis transversis in quovis segmento, nigris.

Nectaria exigua, crassitie sua haud longiora, cylindrica, in macula extrema marginali insidentia.

Cauda nulla.

Rostrum dimidium ventrem superat (ad lineam nectariorum extensem).

Pedes nigri: tarsi postici ceteros tarsos saltem triplo superant longitudine.

Alarum anticarum costa valida venisque brunneis.

Pullus pallide flavus, rostro abdominis apicis excedente, tarsis posticis triplo reliquis longioribus.

Stazzano, ad radicem *Artemisiae campestris*, semel. Septembri 1871.

92. **L. pinicola** KALT. l. c. pag. 154. n. 7. — PASSER.
Aphid. ital. pag. 63. n. 2.
Genuae (Caffè d'Italia) in *Abiete excelsa*. Majo 1863.

93. **L. longirostris** FABR? (*Aphis*). — PASSER. (*Lachnus*)
Gli afidi etc. pag. 38. Aphidid. ital. pag. 63. n. 3.
Serravalle Scrivia. In rinnis corticis *Salicis viminalis*,
S. albae et *Populi nigrae*. Septembri, Octobri.

Gen. CALLIPTERUS

Koch *Aphid.* pag. 208. — PASSER. l. c. pag. 66.

94. **C. Juglandis** FRISC. (*Aphis*) pl. 16. fig. 4-5 (teste
KALT.) — KALT. l. c. (*Lachnus*) pag. 150. n. 3. — Koch l. c.
(*Callipterus*) pag. 222. fig. 295, 296. — PASSER. l. c. pag. 66. n. 4.

Stazzano: in pagina supera secus nervum medium foliorum *Juglandis regiae*. Augusto.

Feminas alatas solitarias reperi; apteras autem parvo in
numero congregatas.

Hic sequentem speciem locare mihi liceat, quae etsi extra
Liguria fines reperta, hactenus in Fauna italica non est re-
censita.

C. oblongus HEYDEN (*Aphis*) Entom. Beitr. in Mus. Sen-
kenberg. Band. II, Heft. 3. — KALT. l. c. pag. 133. n. 101.
Koch (*Callipterus*) l. c. pag. 219. fig. 293, 294.
Intra. In ramulis teneris *Betulae albae*, 24 Septembbris 1871.

Gen. PTEROCHLORUS

RONDANI: Osservaz. sopra p. spec. di Esapodi in Nuovi annali di Scienze nat.

95. **P. longipes** LEON DUR. (*Aphis*) Mem. del' Ist. pag. 243.
PASSER. (*Pterochl.*) Aphidid. ital. pag. 67. n. 4.
Aphis Roboris BOY. DE FONSC, l. c. — RONDANI l. c.
Dryobius croaticus KOCK l. c. pag. 228. fig. 300.

Stazzano et Genuae. Ad teneros ramos *Quercum* et *Castaneae vescae*, vere ad autumnum.

Mas alatus statura minor, alarum corporisque pictura ut femina alata. Reperi in copula; una cum numerosis feminis apteris oviparisi (60-70) aderant 3-5 mares.

Serravalle Scrivia 5 Novembris 1871. in *Quercu Cerri*.

Tribus III PEMPHIGINAE

PASSER. *Aphidid. ital.* pag. 7 et 67.

Gen. SCHIZONEURA

HARTIG, GERMAR'S *Zeiftschr. für Entom.* III.

96. **S. venusta** PASSER. Gli Afidi pag. 38. Aphid. ital. pag. 68. n. 4.

Stazzano ad radices *Setariae viridis*. Octobri 1871.

97. **S. Corni** FAB. et auct. (*Aphis*). — KALT. l. c. pag. 168. n. 1. — KOCH (*Anoecia*) l. c. pag. 273. fig. 348, 349. — PASSER. (*Schiz.*) Aphid. ital. pag. 68 et 69. n. 2.

Schizoneura vagans KOCH l. c. pag. 226. fig. 343.

Stazzano, vagans. Autumno.

98. **S. lanigera** HARTIG (*Aphis*) l. c. pag. 367. — HAUSMAN Illig. Magaz. I, 440. — KALT. l. c. (*Schiz.*) pag. 169. n. 2. — PASSER. l. c. pag. 68 et 69. n. 3.

Prope Genuam (Quinto). Ad ramos *Pyri malii*, aestate.

Gen. PEMPHIGUS

HARTIG *Versuch. einer Einth. der Pflanz. ect. in German's Zeit. für Entom.* Band. III.

99. **P. utricularius** REAUM. (*Aphis*) Insect. T. III. pl. 24. fig. 6. — PASSER. (*Pemphig.*) Gli insetti autori delle galle ecc. in: I Giardini, Vol. III. pag. 260. Aphid. ital. pag. 71 et 72. n. 4.

Stazzano, vagans. Autumno.

100. **P. cornicularius** PASSER. Gli Insetti autori ecc.
l. c. pag. 261. Aphid. ital. pag. 72. n. 2.

In gallis siliquaeformibus ultra spithameis contortis ramulorum Pistaciae Therebinthi. In Horto botanico R. Genuensis Athenaei, 15 Novembris 1871.

101. **P. Filaginis** BOY. DE FONSC. (*Aphis*) l. c. pag. 188.
PASSER. Aphid. ital. pag. 71 et 73. n. 5. (*Pemphigus*).

Pemphigus Gnaphalii KALT. l. c. pag. 180. n. 4. — Koch l. c.
(*Prociphilus*) pag. 283. fig. 334.

Voltri in *Filagine gallica* et *F. germanica*. Julio.

102. **P. Boyeri** PASSER. Aphid. ital. pag. 71 et 73. n. 6.
— *Amycla fuscifrons* Koch l. c. pag. 301. fig. 368-370.

Stazzano ad radices *Zeae Maydis* frequentissima, *Panici eruris galli*, *Lotii perennis*, *Cynodontis Dactylonis*, *Poae pratensis*, *Avenae sativae* ect. Autumno.

103. **P. bursarius** LINN., REAUM. (*Aphis*) Insect. III.
pl. 26, fig. 7, 11. — KALT. (*Pemphig.*) l. c. pag. 182. n. 3. —
Koch l. c. pag. 292. fig. 362, 363. — PASSER. Aphid. ital.
pag. 71 et 75. n. 10.

Gennae in galla globosa *Populi italicae*. Junio.

Gen. TETRANEURA

HARTIG l. c.

104. **T. Ulmi** GEOFFR. (*Aphis*) Insect. T. I. pag. 494. n. 4.
tab. 10. fig. 3. — REAUM. l. c. tab. 25, fig. 4. — KALT. (*Tetraneura*) l. c. pag. 189. n. 4. — Koch l. c. pag. 288. fig. 358,
359. — PASSER. l. c. pag. 78. n. 4.

Stazzano. In galla foliorum *Ulmi campestris* et *Crataegi Oxyacanthae*. Junio.

Gen. APLONEURAPASSER. *Aphidid. ital.* pag. 68 et 78.

103. **A. Lentisci** PASSER. (*Tetraneura*) Gli Insetti ect. l. c. pag. 264. — (*Apaloneura*) ejusd. Aphid. ital. pag. 78. n. 1. Genuae, in *Pistacia Lentisco*, 20 Novembris 1864.

Tribus IV. RHYZOBINAE.PASSER. *Aphidid. ital.***Gen. RHYZOBIUS**BURM. *Handb. II.* pag. 87.

106. **R. Menthae** PASSER. Gli Afidi, pag. 39. — Aphid. ital. pag. 79 et 80.

Stazzano, ad basim radicularum *Menthae arvensis*, lanugine candida obvolutus.

Tribus V. TYCHEINAE.PASSER. *Aphid. ital.***Gen. TYCHEA.**Koch *Die Pflanzenl. Aphid.*

107. **T. Phaseoli** PASSER. Gli Afidi, pag. 39. — Aphid. ital. pag. 81. n. 3.

Stazzano ad radicem *Phaseoli vulgaris*. Septembri 1871.

Tribus VI. CHERMESINAE.PASSER. *Aphidid. ital.* pag. 7 et 82.**Gen. VACUNA. HEYD.**

108. **V. dryophila** SCHRNK (*Aphis*) l. c. n. 1210. — HEYD. (*Vacuna*). — KALT. l. c. pag. 478. n. 2. — Koch l. c. pag. 256. fig. 331, 332, 333, 334. — PASSER. l. c. pag. 83. n. 4.

Stazzano, vagans, Octobri; Genuae, sub foliis *Quercus roboris*, aestate.

PSYLLOPTERA n. gen.

Antennae breves, articulis quatuor in femina alata; articulus extremus setulis duobus.

Alae horizontales, anticae costa et stigmate instructae; vena cubitalis et vena radialis semel furcatae.

Alae posticae venis nullis.

Nectaria et *cauda* desunt.

Tarsi uncis duobus.

109. **Psylloptera quercina** n. sp.

Forma cognita: femina alata. Long. vix 1 millim.

Caput, thorax et oculi nigri, reliqua miniatâ aut pallide testacea.

Antennae diametrum transversum capitidis longitudine aequantes, haud granulatae nec serratae. Articuli duo basilares aequa lati ac longi, tertius obconicus, praecedentibus conjunctis paulo brevior; quartus subcylindricus praecedentes conjunctos fere aequans, setulis duabus brevibus instructus.

Alae anticae apice rotundatae; vena cubitalis in origine obliterata, nervum costalem fere parallele sequitur et ante medium stigmatis venulam dimittit. Vena radialis e nervo costali $\frac{1}{3}$ post basim alae exorta, venam (externe) e medio suo emittit.

Rostrum ad dimidium mesosternum productum.

Pedes medios, validi.

Costa et *stigma* alarum anticarum virescentia.

Stazzano, in pagina infera foliorum *Quercus Cerris*, plurima legi exemplaria 7 Octobris 1864.